

1.3.

MORFOLOGÍA SEGÚN LOCALIZACIÓN



FIGURA 57.



FIGURA 58.



FIGURA 59.



FIGURA 60.



FIGURA 61.



FIGURA 62.

FIGURAS 57, 58, 59, 60, 61 y 62. Los hemangiomas según su topografía suelen tener patrones muy repetitivos. Los hemangiomas segmentarios en manos y pies a menudo tienen una distribución que remeda la de un guante de ciclista, de manera que las puntas de los dedos no están afectas.



FIGURA 63.



FIGURA 64.



FIGURA 65.



FIGURA 66.



FIGURA 67.



FIGURA 68.

FIGURAS 63, 64, 65, 66, 67 y 68. En el antebrazo y mano el patrón cubital (postaxial) (Figs. 63-67) es más frecuente que el radial (preaxial) (Fig. 68).



FIGURA 69.



FIGURA 70.



FIGURA 71.



FIGURA 72.



FIGURA 73.

FIGURAS 69, 70, 71, 72 y 73. Hemangiomas segmentarios de la extremidad superior. Todos ellos tienen una distribución similar, en "bandera" extendiéndose a la zona pectoral.



FIGURA 74A.



FIGURA 74B.



FIGURA 74C.

FIGURA 74 A-C. Los hemangiomas en la planta del pie a menudo tienen esta distribución “en delantal” en la base del segundo, tercer y cuarto dedos del pie.



FIGURA 75.



FIGURA 76.



FIGURA 77.



FIGURA 78.



FIGURA 79.



FIGURA 80.

FIGURAS 75, 76, 77, 78, 79 y 80. En la región malar de la cara los hemangiomas también tienden a tener un patrón repetitivo. Son lesiones, en general, muy voluminosas.